


**Legemidler - Blandekort, Trometamol, Addex-Tham INTENSIV**

D50900

 Utgave:  
3.00

 Gjelder fra:  
16.06.2026

Side 1 av 1

B05XX02	INTENSIV			
	<b>TROMETAMOL</b> Addex-THAM (Fresenius Kabi, uregistrert)			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
3,3 mmol/ml  Inf.kons. hetteglass  <u>Konsentrasjon for bufring:</u> 3 mmol buffer/ml	Må fortynnes videre  <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml eller Glukose 50 mg/ml  <u>IV infusjon:</u> <b>Konsentrasjon buffer</b> <b>0,3 mmol buffer/ml:</b> 50 ml Trometamol, 3 mmol buffer/ml, fortynnes med 450 ml fortynningsvæske  <u>Akuttsituasjoner:</u> <u>IV infusjon i SVK:</u> <b>Konsentrasjon</b> <b>0,6 mmol buffer/ml:</b> 50 ml Trometamol, 3 mmol buffer/ml, fortynnes med 200 ml fortynningsvæske	<u>IV infusjon:</u> Over minst 1 time  <u>Akuttsituasjoner:</u> <u>IV infusjon i SVK:</u> Etter legens forordning. En dose kan gis over 15 minutter.	Holdbarhet er inkludert brukstid  <u>Hetteglass/ Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart	OBS! Tromboflebitt  Ekstravasjon kan gi vevsskade.
Kilder: Svensk preparatomtale, FASS: <a href="#">Addex®-THAM</a> Maler i MetaVision				