

Legemidler - Blandekort, Vitamin B og C, Pabrinex, Syndrex

D50901

 Utgave:
3.00

 Gjelder fra:
20.11.2024

Side 1 av 1

A11E B	SENGEPOST/INTENSIV				
	PABRINEX (Vitamin B og C) Pabrinex Intravenous High Potency (Kyowa Kirin, uregistrert), Syndrex (JSC Farmak, uregistrert)				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
Infusjonskonsentrat Sett à to ampuller <u>Ampulle 1 (5 ml) inneholder:</u> Tiamin (B1) 250 mg Riboflavin (B2) 4 mg Pyridoksin (B6) 50 mg <u>Ampulle 2 (5 ml) inneholder:</u> Nikotinamid (B3) 160mg Askorbinsyre (C) 500 mg Glukose 1000 mg	Ampulle 1 og 2 skal trekkes opp (blandes) i samme sprøyte før videre fortynning	Må fortynnes før bruk* <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV infusjon:</u> Stamløsningen fortynnes med 50-100 ml fortynningsvæske	<u>IV infusjon:</u> Over 30 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 7 timer i RT	Kan gi smerte på injeksjonsstedet. Kan gi anafylaksi/ alvorlige allergiske reaksjoner. Kan gi hypotensjon. *Stamløsningen kan ved væskerestriksjoner gis ufortynnet på sprøytepumpe, etter legens forordning

Kilder:

 The electronic medicines compendium (emc), engelsk preparatomtale [Pabrinex](#)

NHS Injectable Medicines Guide

The College London Hospitals University Pharmacy Department: Injectable medicines administration guide, 3rd ed. Wiley-Blackwell 2010