


**Legemidler - Blandekort, Sotrovimab**

D51234

 Utgave:  
2.00

 Gjelder fra:  
09.01.2024

Side 1 av 1

J06B D05	Intensiv/Sengepost			
	<b>SOTROVIMAB</b> Xevudy®			
Styrke	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet RT= romtemperatur K = kjøleskap	Merknader
500 mg  Infusjons- konsentrat	Må fortynnes før bruk.  <u>Fortynningsvæske:</u> Natriumklorid 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml  Ta ut hetteglasset fra kjøleskapet ca 15 minutter før fortynning.  Før opptrekk av dose blandes innholdet i hetteglasset forsiktig ved å rotere på hetteglasset flere ganger. Ikke rist!  8 ml sotrovimab fortynnes i enten 42 eller 92 ml fortynningsvæske*  Bland innholdet ved å forsiktig bevege posen frem og tilbake 3-5 ganger. Infusjonsposen må ikke snus/vendes ( <i>dette for å unngå skumdannelse</i> ).	<u>Kun til IV infusjon:</u> Benytt et in-line filter på 0,2 µm ( <i>epiduralfilter</i> )  Gis over 30 minutter.	Holdbarhet er inkludert brukstid.  <u>Hetteglass:</u> Kun til engangsbruk.  <u>Fortynnet løsning:</u> 6 timer RT 24 timer K	Løsning med partikler skal ikke brukes.  Overskuddet i hetteglasset skal kastes.  Batchnummer på hetteglasset skal registreres i pasientjournal.  Pasienten skal observeres under pågående infusjon og i mist 1 time etter infusjonen er avsluttet.  * Trekk ut og kast 8 ml fortynningsvæske av valgt pose (50 eller 100 ml) før tilsetning av infusjonskonsentratet.
Kilder: Norsk preparatomtale (SPC), Statens legemiddelverk – <a href="http://www.legemiddelverket.no">www.legemiddelverket.no</a> januar 2022				