

→ Sårbehandling etter kirurgi

KIRURGISKE INNGREP

Ved åpen operasjon skal såret dekket av steril bandasje i minst 48 timer. Etter 48 timer kan du dusje uten bandasje.

ORTOPEDISKE INNGREP

Ved protesekirurgi dekkes det med bandasje til sting/stifter er fjernet på grunn av infeksjonsfare.

Sting/stifter fjernes som regel 12-14 dager etter operasjon hvis ikke annen beskjed er gitt. Husk å avtale time med ditt legekantor.

ANDRE TYPER INNGREP

Ved kikkehullsoperasjoner og andre mindre hudsnitt, skal sårene dekket av steril bandasje i minst 24 timer. Etter 24 timer kan du dusje.

Noen pasienter har sting som skal løse seg opp av seg selv. Hvis disse ikke har løst seg opp og falt av innen 14 dager etter operasjon, kan det være nødvendig å

klippe de bort. Du kan eventuelt bruke en saks til dette hvis stingene ikke lar seg fjerne med å trekke litt i dem.

Noen pasienter foretrekker å bruke bandasje utover 48/24 timer. Dette gjelder særlig hvis såret er lukket med *cutane suturer* (sting i huden som ikke løser seg opp selv) eller *agraffer* (stifter i huden) fordi disse har en tendens til å henge seg fast i klærne.

Bandasjer kan kjøpes på apotek.

Dersom det siver væske eller blod fra såret, eller det blir rødt rundt operasjonsfeltet og/eller du får feber, eller er smertefullt kontakt fastlegen din.

Spør oss hvis du lurer på noe.

Vennlig hilsen

Kirurgiske avdelinger i Sykehuset Innlandet

Tlf. 915 06 200 | www.sykehuset-innlandet.no