



Øye - Preoperativ desinfeksjon med Klorhexidin 1mg/ml

D51636

Utgave:
1.02

Gjelder fra:
04.07.2025

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

- Sikre korrekt fremgangsmåte ved bruk av Klorhexidin 1mg/ml som preoperativ desinfeksjon ved operasjoner i og området rundt øyet.
- Preoperativ desinfeksjon i øyeområdet forebygger øyeinfeksjon ved at det senker bakteriefloraen på øyet og øyets omgivelser.
- Gjelder bruk av Klorhexidin 1mg/ml som preoperativ desinfeksjon ved alle øyeoperasjoner, med unntak av intraoculære operasjoner og intravitale injeksjoner.

Ansvar/målgruppe

- Personell ved Øyeavdelingen som utfører preoperativ desinfeksjon.

Handling

- Kontroller øye som skal opereres
- Klargjør utstyr:
 - Vaskesett med sterile hansker
 - Klorhexidin 1mg/ml
- Fukt 5 stk tupfere med Klorhexidin 1mg/ml pr. øye
- Vask cilie fra lateral til medial, med 2 tupfere. OBS væsken skal ikke inn i øyet.
- Vask deretter resten av operasjonsfeltet 3 ganger med resterende tupfere
- Pass på at det ikke renner desinfeksjonsvæske i pasientens øre, da klorhexidin er ototoksisk, og gir døvhets ved kontakt med det indre øret
- Total virketid minst 2 minutter. Lufttørkes før dekking. jfr. [Peroperative forberedelser: huddesinfeksjon](#).

Referanser

[SI/17.34-02](#)

Peroperative forberedelser: huddesinfeksjon