



Legemidler - Blandekort, Esomeprazol

D51890

Utgave:
2.00Gjelder fra:
02.03.2025

Side 1 av 1

A02BC05	SENGEPOST/INTENSIV				
	ESOMEPRAZOL				
Nexium®, Esomeprazol Øresund Pharma®					
Styrke	Stamløsning	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
40 mg Infusjons- substans Hetteglass	40 mg tørrstoff løses i 5 ml NaCl 9 mg/ml Konsentrasjon: 8 mg/ml	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre. <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml <u>IV injeksjon 40mg:</u> Stamløsningen gis ufortynnet. <u>IV infusjon:</u> 40 mg løses i 100 ml fortynningsvæske. 80 mg løses i 100 ml fortynningsvæske. <u>IV kontinuerlig infusjon, volumpumpe:</u> Konsentrasjon 0,8 mg/ml: 80 mg løses i 100 ml fortynningsvæske <u>IV kontinuerlig infusjon, sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 1,6 mg/ml: 80 mg = 10 ml stamløsning fortynnes med 40 ml fortynningsvæske til totalt 50 ml.	<u>IV injeksjon:</u> Gis over minst 3 minutter. Maks 40 mg. <u>IV infusjon:</u> 40 mg: Gis over 10-30 minutter 80mg: Gis over 30 minutter <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Etter legens ordinasjon. Vanligvis 8 mg/time	Holdbarhet er inkludert brukstid. <u>Stamløsning:</u> 12 timer RT <u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer RT <u>Kontinuerlig infusjon:</u> 12 timer RT	Stamløsningen har klar eller gulaktig farge. OBS! Tromboflebitt. Ekstravasasjon kan gi vevsskade. Ved bruk av hele hetteglass (dose 40-80 mg) kan disse løses rett i 100 ml NaCl 9 mg/ml vha overførings- adapter.
Kilder: Statens legemiddelverk preparatomtale (SPC) - Nexium Injectable Drugs Guide, nettgave februar 2025					