


**Legemidler - Blandekort, Esomeprazol**

D51890

 Utgave:  
2.00

 Gjelder fra:  
02.03.2025

Side 1 av 1

A02BC05	SENGEPOST/INTENSIV				
	<b>ESOMEPRAZOL</b> Nexium®, Esomeprazol Øresund Pharma®				
Styrke	Stamløsning	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
40 mg  Infusjons- substans  Hetteglass	40 mg tørrstoff løses i 5 ml NaCl 9 mg/ml  <b>Konsentrasjon: 8 mg/ml</b>	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre.  <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml  <u>IV injeksjon 40mg:</u> Stamløsningen gis ufortynnet.  <u>IV infusjon:</u> <b>40 mg</b> løses i 100 ml fortynningsvæske. <b>80 mg</b> løses i 100 ml fortynningsvæske.  <u>IV kontinuerlig infusjon, volumpumpe:</u> <b>Konsentrasjon 0,8 mg/ml:</b> 80 mg løses i 100 ml fortynningsvæske  <u>IV kontinuerlig infusjon, sprøytepumpe:</u> <b>Konsentrasjon 1,6 mg/ml:</b> 80 mg = 10 ml stamløsning fortynnes med 40 ml fortynningsvæske til totalt 50 ml.	<u>IV injeksjon:</u> Gis over minst 3 minutter. Maks 40 mg.  <u>IV infusjon:</u> <b>40 mg:</b> Gis over 10-30 minutter <b>80mg:</b> Gis over 30 minutter  <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Etter legens ordinasjon.  Vanligvis 8 mg/time	Holdbarhet er inkludert brukstid.  <u>Stamløsning:</u> 12 timer RT  <u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer RT  <u>Kontinuerlig infusjon:</u> 12 timer RT	Stamløsningen har klar eller gulaktig farge.  OBS! Tromboflebitt.  Ekstravasasjon kan gi vevsskade.  Ved bruk av hele hetteglass (dose 40-80 mg) kan disse løses rett i 100 ml NaCl 9 mg/ml vha overførings- adapter.
<b>Kilder:</b> Statens legemiddelverk preparatomtale (SPC) - <a href="#">Nexium</a> Injectable Drugs Guide, nettgave februar 2025					