



Legemidler - Blandekort, Landiolol

D52948

Utgave:
2.00Gjelder fra:
16.06.2026

Side 1 av 1

C07A B14	INTENSIV																																										
	LANDIOLOL Raploc (Amomed) [®]																																										
Styrke	Stamløsning og videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader																																							
Hetteglass, 300 mg Pulver til infusjonsvæske	Må rekonstitueres før bruk <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV infusjon:</u> <u>Sprøytepumpe</u> Konsentrasjon 6 mg/ml: 300 mg løses i 50 ml fortynningsvæske.	Administreres IV via sentralt eller perifert venekateter. <u>IV kontinuerlig infusjon</u> Gis med sprøytepumpe etter legens ordinasjon. Infusjonshastighet: Vanlig infusjonshastighet er 10-40 mcg/kg/min. Lavere dose benyttes ved hjertedysfunksjon. Infusjonshastighet i ml/time:	Holdbarhet er inkludert brukstid. <u>Hetteglass:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning/kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer RT	Kan gi bradykardi og hypotensjon. Dette kan reverseres ved dosereduksjon eller seponering. Monitorer blodtrykk og EKG. Hvis rask effekt er ønskelig, kan man gi en ladnings-dose på 100 mcg/kg over 1 minutt. Maks anbefalt døgndose er 57,6 mg/kg/døgn (tilsvarende 40 mcg/kg/min i 24 timer).																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vekt (kg)</th> <th>10 mcg/kg/min</th> <th>20 mcg/kg/min</th> <th>30 mcg/kg/min</th> <th>40 mcg/kg/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>18</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>7</td> <td>14</td> <td>21</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>8</td> <td>16</td> <td>24</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>9</td> <td>18</td> <td>27</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Vekt (kg)	10 mcg/kg/min	20 mcg/kg/min	30 mcg/kg/min	40 mcg/kg/min	40	4	8	12	16	50	5	10	15	20	60	6	12	18	24	70	7	14	21	28	80	8	16	24	32	90	9	18	27	36	100	10	20	30	40	
Vekt (kg)	10 mcg/kg/min	20 mcg/kg/min	30 mcg/kg/min	40 mcg/kg/min																																							
40	4	8	12	16																																							
50	5	10	15	20																																							
60	6	12	18	24																																							
70	7	14	21	28																																							
80	8	16	24	32																																							
90	9	18	27	36																																							
100	10	20	30	40																																							
Kilder: Norsk preparatomtale (SPC), Direktoratet for medisinske produkter: Raploc Mal i MetaVision																																											