



Legemidler - Blandekort, Landiolol

D52948

Utgave:
1.00Gjelder fra:
16.11.2023

Side 1 av 1

C07A B14	Intensiv																																										
	LANDIOLOL Raploc (Amomed) [®]																																										
Styrke	Stamløsning og videre fortykning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader																																							
Hetteglass, 300 mg	Må rekonstitueres før bruk	Administreres IV via sentralt eller perifert venekateter.	Holdbarhet er inkludert brukstid.	Kan gi bradykardi og hypotensjon. Dette kan reverseres ved dosereduksjon eller seponering. Monitorer blodtrykk og EKG. Hvis rask effekt er ønskelig kan man gi en ladningsdose på 100 mcg/kg over 1 minutt. Maks anbefalt døgndose er 57,6 mg/kg/døgn (tilsvarer 40 mcg/kg/min i 24 timer).																																							
Pulver til infusjonsvæske	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV infusjon:</u> <u>Sprøytepumpe</u> Konsentrasjon 6 mg/ml: 300 mg løses i 50 ml fortynningsvæske.	<u>IV kontinuerlig infusjon</u> Gis med sprøytepumpe etter legens ordinasjon. Infusjonshastighet: Vanlig infusjonshastighet er 10-40 mcg/kg/min. Lavere dose benyttes ved hjertedysfunksjon. Infusjonshastighet i ml/time: <table border="1" data-bbox="620 1234 1158 1653"> <thead> <tr> <th>Vekt (kg)</th> <th>10 mcg/kg /min</th> <th>20 mcg/kg /min</th> <th>30 mcg/kg /min</th> <th>40 mcg/kg /min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>18</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>7</td> <td>14</td> <td>21</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>8</td> <td>16</td> <td>24</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>9</td> <td>18</td> <td>27</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Vekt (kg)		10 mcg/kg /min	20 mcg/kg /min	30 mcg/kg /min	40 mcg/kg /min	40	4	8	12	16	50	5	10	15	20	60	6	12	18	24	70	7	14	21	28	80	8	16	24	32	90	9	18	27	36	100	10	20	30	40
Vekt (kg)	10 mcg/kg /min	20 mcg/kg /min	30 mcg/kg /min	40 mcg/kg /min																																							
40	4	8	12	16																																							
50	5	10	15	20																																							
60	6	12	18	24																																							
70	7	14	21	28																																							
80	8	16	24	32																																							
90	9	18	27	36																																							
100	10	20	30	40																																							
Kilder: SPC, Statens legemiddelverk: Raploc Mal i MetaVision																																											