


**Legemidler - Blandekort, Alteplase (Actilyse)**

D53013

 Utgave:  
1.00

 Gjelder fra:  
04.12.2023

Side 1 av 1

B01A D02	Akuttmottak/Intensiv				
	ALTEPLASE Actilyse®				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Rom- temperatur	Merknader
10 mg, 20 mg og 50 mg  Pulver og væske til infusjons- /inj.væske  Hetteglass	<b>Konsentrasjon 1 mg/ml:</b> Pulveret løses i medfølgende oppløsningsvæske: 10 mg i 10 ml 20 mg i 20 ml 50 mg i 50 ml  Spike settes i væske- glasset først og så pulverglass på toppen. For 10 mg hetteglass – benytt sprøyte og kanyle for overføring.  Bland forsiktig uten å riste for å unngå skumdannelse.	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml  <u>IV injeksjon/bolus:</u> Stammløsningen gis ufortynnet  <u>IV infusjon:</u> Følg aktuell protokoll  Fortynnes i 50-250 ml fortynningsvæske Minimum 0,2 mg/ml	<u>IV injeksjon/ bolus</u> Gis over 1-2 minutter  <u>IV infusjon</u> Gis etter legens ordinasjon og aktuell protokoll. Gis på infusjons- pumpe	Holdbarhet er inkludert brukstid  <u>Stamløsning/ fortynnet løsning:</u> 8 timer RT 24 timer K	Skal ikke blandes med andre legemidler eller gis samtidig gjennom samme kateter (heller ikke heparin).

**Kilder:**

 SPC, Statens legemiddelverk: [Actilyse](#)

Maler fra MetaVision

 EK: Lungeemboli – Trombolytisk behandling ([Lungeemboli - Trombolytisk behandling \(sykehuspartner.no\)](#))

 Hjerteinfarkt - Actilysebehandling ved stemi ([dok52124.pdf \(sykehuspartner.no\)](#))

 Hjerneslag – pasientforløp, prosedyreoversikt ([Hjerneslag - pasientforløp, prosedyreoversikt \(sykehuspartner.no\)](#))