


Legemidler - Blandekort, Desmopressin

D53015

 Utgave:
2.00

 Gjelder fra:
16.06.2026

Side 1 av 1

H01B A02	INTENSIV/ANESTESI			
	DESMOPRESSIN Octostim (Ferring) [®]			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
15 µg/ml Injeksjons- væske Ampulle 1 ml	Kan gis ufortynnet eller fortynnet videre <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml <u>SC injeksjon:</u> Gis ufortynnet <u>IV injeksjon:</u> Gis ufortynnet <u>IV infusjon:</u> Forordnet dose fortynnes i 50-100 ml fortynningsvæske	<u>SC injeksjon</u> Gis etter legens ordinasjon <u>IV injeksjon</u> Gis etter legens ordinasjon <u>IV infusjon</u> Gis over 15-30 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid. <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart etter tilberedning	Kan gi forbigående hypotensjon med reflekstakykardi og ansiktsrødming. Blodtrykk og puls skal monitoreres. Kan gi væskeretensjon og hyponatremi – monitorer væskebalanse. Øvrige bivirkninger er hodepine, magesmerter og kvalme
<u>Kilder:</u> SPC, Direktoratet for medisinske produkter: Octostim Micromedex Metodebok Organdonasjon - organbevarende behandling Maler i MetaVision				