

## Legemidler - Blandekort, Desmopressin

D53015

Utgave:  
1.00Gjelder fra:  
16.11.2023

Side 1 av 1

H01B A02	Intensiv/Anestesi			
	DESMOPRESSIN Octostim (Ferring) <sup>®</sup>			
Styrke	Stamløsning og videre fortykning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
15 µg/ml  Injeksjons- væske  Ampulle 1 ml	Kan gis s.c. ufortynnet eller fortyntet som i.v. infusjon  <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml  <u>IV infusjon:</u> Forordnet dose fortynnes i 50-100 ml fortynningsvæske	<u>SC inj.</u> Gis ufortynnet  <u>IV infusjon</u> Gis over 15-30 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid.  <u>Ampuller:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart etter tilberedning.	Kan gi forbigående hypotensjon med reflekstakykardi og ansiksrødming. Blodtrykk og puls skal monitoreres.  Kan gi væskeretensjon og hyponatremi – monitorer væskebalanse.  Øvrige bivirkninger er hodepine, magesmerter og kvalme
<u>Kilder:</u> SPC, Statens Legemiddelverk: <a href="#">Octostim</a> Maler i MetaVision				