



Legemidler - Blandekort, Midazolam

D53191

Utgave:
1.00Gjelder fra:
02.01.2024

Side 1 av 1

Intensiv

N05C D08

MIDAZOLAM

Midazolam B.Braun®, Midazolam Panpharma®, Midazolam Accord®, Midazolam Accordpharma®

Styrke	Stamløsning Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = Kjøleskap RT = Romtemperatur	Merknader
1 mg/ml 5 mg/ml Inf. væske/ Inj. væske Ampulle og hetteglass	<p>Kan brukes ufortynnet, eller fortynnes videre.</p> <p><u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9mg/ml (Glukose 50 mg/ml)</p> <p><u>IV injeksjon:</u> Konsentrasjon 1 mg/ml: Gis ufortynnet eller fortynnes videre.</p> <p><u>IV kontinuerlig infusjon, sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 1 mg/ml: Gis ufortynnet eller fortynning av 5 mg/ml løsning til 1 mg/ml: 10 ml av 5 mg/ml løsning blandes med 40 ml NaCl 9 mg/ml</p> <p>Konsentrasjon 5 mg/ml: Gis ufortynnet.</p>	<p><u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt, ca. 1 mg pr 30 sek. (Avhengig av alder, vekt og respons).</p> <p><u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Skal administreres med sprøytepumpe.</p> <p><u>Infusjonshastighet:</u> Etter legens ordinasjon.</p> <p>Vanlig startdose er 0,02 mg/kg/t. Vanlig doseringsområde er 0,05-0,6 mg/kg/t.</p>	<p>Holdbarhet er inkludert brukstid.</p> <p><u>Ampuller:</u> Engangsbruk</p> <p><u>Hetteglass:</u> 12 timer RT 24 timer K</p> <p><u>Kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer i RT</p>	<p>OBS! Tromboflebitt!</p> <p>Ekstravasasjon kan gi vevsskade.</p> <p>Kan gi hypotensjon, bradykardi og respirasjonsdepresjon.</p> <p>Intramuskulær injeksjon (dypt i stor muskel) er svært smertefullt og bør unngås om mulig.</p> <p>Subkutan injeksjon benyttes ved palliasjon.</p>

Kilder:

SPC, Statens legemiddelverk: [Midazolam](#)

eHåndbok OUS: [eHåndbok - Midazolam - blandekort for voksne, intensiv / overvåkning \(ous-hf.no\)](#)

Injectable Medicines Administration Guide, 3rd ed 2010

Injectable Drugs Guide