

Gynekologi - Endometriebiopsi

D53369

 Utgave:
1.01

 Gjelder fra:
20.04.2026

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

- Sikre optimal undersøkelse av endometriet uten narkose
- Sikre at riktig utstyr er tilgjengelig og at legen får nødvendig assistanse
- Sikre forsvarlig prøvetaking og forsendelse
- Gjelder pasienter med vaginal blødning som behandles ved gynekologisk- eller fødeavdeling

Ansvar/målgruppe

- Gjelder leger og sykepleiere ved gynekologisk og/eller fødeavdeling

Handling

Lege

- Utføre gynekologisk undersøkelse og prøvetaking
- Sende skriftlig svar til pasienten når prøvesvar foreligger

Sykepleier

- Tilrettelegge utstyr:
 - Selvholdende spekelum
 - Kuletang
 - Pippelle-endocell
 - Prøveglass med Formalin 4%. 30 ml
- Sende prøvematerialet jfr. prosedyre [metodebok.no - Patologi, Bestille - Brukerveiledere og prosessbeskrivelser \(HSØ\)](https://metodebok.no): Velg gyn → endometrium → og rett prøvetakingsmåte. Ved CITO merkes lokket med rød tusj strek. Prøven sendes til analysering på patologisk avdeling etter avdelingens rutiner
- Observere pasienten etter prøvetaking, spesielt med tanke på svimmelhet, smerter og blødning.
- Anbefale pasienten om å bruke bind etter prøvetaking. Informere om at prøvesvar blir sendt skriftlig til pasienten

Referanser

 Metodebok.no Patologi, bestille [Metodebok](https://metodebok.no)
[SI/17.16.07-01](https://metodebok.no/SI/17.16.07-01)
[Histologisk undersøkelse - generell informasjon](https://metodebok.no/Histologisk%20undersokelse%20-%20generell%20informasjon)