



Legemidler - Blandekort, Tocilizumab

D53874

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
22.05.2025

Side 1 av 1

L04AC07	INTENSIV/SENGEPOST			
	Tocilizumab RoActemra®			
Styrke	Stamløsning og videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet RT=Romtemperatur K=Kjøleskap	Merknader
20 mg/ml	Må fortynnes før bruk	<u>IV infusjon:</u> Gis over 60 minutter Gis på volumpumpe Må ikke gis som bolus	Holdbarhet er inkludert brukstid	Kan gi hypertensjon/hypotensjon og svimmelhet
Infusjonskonsentrat	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml		<u>Hettglass:</u> 12 timer RT 24 timer K	Puls og blodtrykk bør monitoreres
Hetteglass	Et volum tilsvarende beregnet dose tocilizumab (i ml) trekkes ut av en 100 ml infusjonspose og kastes. Beregnet dose tilsettes deretter i infusjonsposen. Vend posen forsiktig, ikke rist. Ved skumdannelse, la posen ligge en stund.		<u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT/K	Observasjon og anafylaksiberedskap etter enhetens rutiner
<u>Kilder:</u> Produktomtale, SPC RoActemra Injectable Medicines Adm. Guide 3. ed				