


Legemidler - Blandekort, Bumetanid

D54257

 Utgave:
1.00

 Gjelder fra:
18.02.2025

Side 1 av 1

C03CA02	SENGEPOST/INTENSIV			
	BUMETANID Burinex®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
0,5 mg/ml Ampuller, 4 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV infusjon:</u> Fortynnes i egnet volum, anbefalt 500 ml Anbefalt makskonsentrasjon ved fortynning: 0,1 mg/ml	Kan gis ufortynnet IV og IM <u>IV bolus:</u> Dose opp til 2 mg gis over 1-5 minutter <u>IV infusjon:</u> Fortynnet i 500 ml gis over 30-60 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampulle:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer i RT	Kan gi hypotensjon og svimmelhet Økt risiko for ototoksisitet ved for rask administrasjon
Kilder: Produktomtale, SPC Burinex Injectable Drugs Guide, nettutgave februar 2025				