

Legemidler - Blandekort, Metylprednisolon

D54965

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
17.06.2025

Side 1 av 1

H02A B04	AKUTTMOTTAK/SENGEPOST/INTENSIV				
	Metylprednisolon Solu-Medrol, Metylprednisolon Aurora Medical				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
Pulver og væske til inj/inf.væske Tokammer-hgl 40 mg 125 mg ukonservert Hetteglass +glassamp, 500 mg 1 g konservert	<u>40 mg og 125 mg:</u> Tokammer-hetteglasset trykkes sammen og ristes til klar løsning <u>500 mg og 1 g:</u> Pulver løses med medfølgende oppløsningsvæske	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IM injeksjon:</u> Gis ufortynnet <u>IV injeksjon:</u> Gis ufortynnet eller fortynnes i egnet volum <u>IV infusjon:</u> Fortynnes videre med 50–250 ml fortynningsvæske 500 mg løses i 100 ml fortynningsvæske 1 g løses i 250 ml fortynningsvæske	<u>IM injeksjon:</u> Gis langsomt <u>IV injeksjon:</u> Gis over minst 5 minutter. Maksimalt 250 mg <u>IV infusjon:</u> Under 500 mg kan gis over 15 minutter, 500 mg gis over 30-60 minutter, 1 g gis over 2 timer	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>40 mg hetteglass:</u> <u>Stamløsning:</u> 24 timer K <u>Fotynnet løsning:</u> 3 timer RT 24 timer K <u>125 mg, 500 mg og 1 g:</u> <u>Stamløsning:</u> 12 timer RT <u>Fortynnet løsning:</u> 3 timer RT 24 timer K	Rask infusjon av høye doser kan i sjeldne tilfeller gi arytmi, hjertestans og sirkulatorisk kollaps Kan gi bradykardi, hypotensjon, hypertensjon, kvalme, oppkast, muskelsmerter

Kilder:

Preparatomtale (SPC) - [Solu-Medrol](#)

Preparatomtale [Solu-Medrol Produktresumé FASS](#)

USL Injectable Medicines Administration Guide 3.ed

Micromedex via Helsebiblioteket

Maler i MetaVision