

Legemidler - Blandekort, Prometazin

D55135

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
02.07.2025

Side 1 av 1

R06A D02	AKUTTMOTTAK/SENGEPOST/INTENSIV			
	PROMETAZIN Phenergan			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = Kjøleskap RT = Romtemperatur	Merknader
25 mg/ml Inj.væske Ampuller	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml eller Sterilt vann <u>IV injeksjon:</u> 1 ml fortynnes med 9 ml sterilt vann til inj <u>IV infusjon:</u> 12,5 mg – 50 mg blandes i 50 ml NaCl 9 mg/ml, 75 mg blandes i 100 ml NaCl 9 mg/ml Maksimalkonsentrasjon etter fortynning: 1 mg /ml	<u>IM injeksjon:</u> Gis ufortynnet. Vanlig dose 25-50 mg settes dypt intramuskulært <u>IV injeksjon/infusjon:</u> Bør gis i SVK eller stor perifer vene <u>IV injeksjon:</u> Maksimalt 25 mg/min <u>IV infusjon:</u> Gis over 20-40 minutter Maksimal inf. hastighet 12,5-50 mg: 2,5 ml/min 75 mg: 5 ml/min	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampulle:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 4 timer i RT 24 timer K	Kraftig vevsirriterende, risiko for nekrose ved ekstravasasjon Må ikke infunderes via kateter på hånd eller wrist Kan gi hypotensjon og økt puls/hjertebank Misfarget løsning må ikke brukes
<u>Kilder:</u> Produktomtale (SPC) Medicines Complete Injectable Medicines Administration Guide, 3.ed Maler i MetaVision				