

Legemidler - Blandekort, Dihydralazin

D55475

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.03.2026

Side 1 av 1

C02DB01	INTENSIV				
	DIHYDRALAZIN				
	Nepresol				
Styrke	Stamløsning	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K=Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader
Ampulle med tørrstoff, 25 mg Ampulle med væske til injeksjon, 2 ml	Ampulle, 25 mg, løses i medfølgende væske, 2ml = Konsentrasjon 12,5 mg/ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml <u>IV/IM injeksjon:</u> Kan gis ufortynnet <u>IV infusjon:</u> Konsentrasjon 0,1 mg/ml 2 ml (=25 mg) av stamløsning fortynnes i 248 ml fortynningsvæske	<u>IM injeksjon:</u> Gis etter legens ordinasjon <u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt over 2 minutter <u>IV infusjon:</u> Gis på volumpumpe etter legens ordinasjon	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Bruk PVC-frie infusjonsposer og infusjonssett. (Infusjonsposene fra B.Braun og Freeflex er PVC-frie.) Må ikke blandes i glukose, da glukoseløsninger inaktiverer dihydralazin
<u>Kilder:</u> Tysk produktomtale, Teofarma S.r.l. Legemiddelhåndboka, Dihydralazin Maler i MetaVision					