



Legemidler - Blandekort, Ketamin

D55477

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.03.2026

Side 1 av 1

N01AX03	INTENSIV/ANESTESI			
	KETAMIN Ketalar®, Ketamin Abcur®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K=Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader
Hetteglass 10 mg/ml, 20 ml 50 mg/ml, 10 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Kan gis ufortynnet, men maksimalt 10 mg/ml i perifer vene <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Gis på sprøytepumpe Konsentrasjon 10 mg/ml Løsning 10 mg/ml kan benyttes ufortynnet eller 10 ml av løsning 50 mg/ml (=500 mg) fortynnes i 40 ml fortynningsvæske Konsentrasjon 50 mg/ml 50 mg/ml kan benyttes ufortynnet	<u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt, over minst 1 minutt <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Gis på sprøytepumpe etter legens ordinasjon	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Anbrutt hetteglass:</u> 7 dager i RT <u>Kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer i RT	Respirasjon, blodtrykk og puls må monitoreres. Bivirkninger kan være hallusinasjoner og krampelignende muskelbevegelser, kvalme og oppkast
Kilder: SPC, Direktoratet for medisinske produkter: Ketalar Maler i MetaVision				