



Legemidler - Blandekort, Terbutalin

D55479

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.03.2026

Side 1 av 1

R03CC03	INTENSIV/ANESTESI/AKUTTMOTTAK/SENGEPOST			
	TERBUTALIN Bricanyl® Astra Zeneca, Bricanyl®2care4			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K=Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader
0,5 mg/ml Ampulle, 1 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>SC injeksjon:</u> Kan gis ufortynnet <u>IV injeksjon:</u> Ordinert dose fortynnes med NaCl opp til 10 ml <u>IV infusjon: *</u> 1 ml (0,5 mg) fortynnes i 100 ml Glukose <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Sprøytetpumpe 0,1 mg/ml (=100 mcg/ml) 10 ml (5 mg) fortynnes i 40 ml fortynningsvæske Volumpumpe 5 mcg/ml (=0,005 mg/ml) 2 ml (1 mg) fortynnes i 198 ml fortynningsvæske	<u>SC injeksjon:</u> Gis etter legens ordinasjon <u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt over 5 minutter <u>IV infusjon:</u> Gis over 30-60 minutter <u>IV kontinuerlig infusjon,</u> <u>sprøytetpumpe:</u> Gis etter legens ordinasjon <u>IV kontinuerlig infusjon,</u> <u>volumpumpe:</u> Gis etter legens ordinasjon	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer i RT	*Behandling av hyperkalemi
Kilder: Norsk produktomtale, SPC, Direktoratet for medisinske produkter: Bricanyl Maler i MetaVision				