

Legemidler - Blandekort, fosfenytoin

D55488

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
26.01.2026

Side 1 av 1

N03AB05	AKUTTMOTTAK/INTENSIV/SENGEPOST			
	FOSFENYTOIN Pro-Epanutin®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K=Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader
Konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæske 75 mg/ml (=50 FNE/ml) Hetteglass, 10 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV bolus infusjon:</u> Beregnet dosevolum (ml) fortynnes i tilsvarende volum av fortynningsvæske (1:1) <u>IV infusjon:</u> Sprøytepumpe: Beregnet dosevolum (ml) fortynnes til totalt 50 ml med fortynningsvæske Volumpumpe: Beregnet dosevolum (ml) fortynnes til totalt 100 ml med fortynningsvæske. Trekk ut tilsvarende volum i forkant av tilsetningen	<u>IV infusjon:</u> Gis i SVK* via sprøyte-/volumpumpe <u>Infusjonshastighet:</u> 50-100 FNE/minutt. Infusjonshastighet skal ikke overstige 150 mg FNE/min Status epilepticus: Metningsdose Gis som i.v. bolus 20 mg FNE/kg med en hastighet på 100 - 150 mg FNE/minutt. Vedlikeholdsdose 5 mg FNE/kg/døgn. Gis som i.v. infusjon	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Hetteglass:</u> 12 timer RT <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Ekstravasasjon kan gi vevsskade. Monitorer EKG, blodtrykk og respirasjon. Observer minst 30 minutter etter avsluttet infusjon. Kan gis i en stor perifer vene, hvis sentral inngang ikke er etablert. FNE = Fosfenytoin-ekvivalenter (den dosen som tilsvarer klassisk fenytoin i mg). Oppbevares i kjøleskap. Uåpnet hetteglass kan oppbevares ved romtemperatur i opptil 24 timer.
Kilder: SPC, Direktoratet for medisinske produkter: Pro-Epanutin Nevro NEL Status epilepticus Epilepsibehandling (SSE/OUS), Metodebok Status epilepticus SSE/OUS Medicines Complete, Extended stability for Parenteral Drugs Maler i MetaVision				