

Øye - Blepharochalase

D55792

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
26.03.2026

Side 1 av 2

Definisjon	Fjerne overflødig hud på øyelokk
Instrumenter	
Dekking/Utstyr	Elverum: • Plastic surgery eye pack • Instrumenter til små inngrep • Evt steril tusj • Evt. Westcott Tenotomy saks • Evt. Batteri Cauter eller Hyfrector 2000 m/diatermipinsett • Selvklebende hullduk Ø 6x15 cm hull • NaCl 9 mg/ml skyllevæske • Absorbent sticks (tannlegedotter) • Store tupfere, 1 pakke • Steri-strips + evt. brun micropore tape • Tillegg ved nedre blepharochalase ○ 1 rett saks ○ 1 steril merkepenn Lillehammer: • Plastic surgery eye pack • Epidural drape 75x80 • Instrumentskrin merket "Plast.opr" • Steril merkepenn • Diatermipinsett + Hyfrector 2000 (engangscauter ved behov) • NaCl 9mg/ml • Brun micropore til taping av såret
Knivblad	• Nr. 15
Suturer	Optilene 6/0
Preoperativ forberedelse	Elverum: • Gi premedikasjon; 1 g Paracet per os • Lege merker av hud med merkepenn og benytter evt. Anatomisk pinsett. Pasienten <u>sitter</u> når legen merker av området som skal opereres. • Informere muntlig om inngrepet og gi informasjonsskriv: Pasientinformasjon - Tunge øyelokk • Forberedelse i operasjonsslusa ○ Hette over håret ○ Frakk (på stue 1 og 2) Lillehammer: • Kontrollere pasientens identitet og aktuelle øye

	• Hette over håret Anestesi Elverum/Lillehammer: Dråper: • Tetrakain 1% eller Oxibuprokain 4mg/ml Lokal injeksjon: • Xylokain 20 mg/ml med adrenalin 0,005 mg/ml (Evt Lidocain 20mg/ml)
Leiringsutstyr	
Leiring	Ryggleie
Huddesinfeksjon	Jfr. Prosedyre: Øye - Preoperativ desinfeksjon med Klorhexidin 1mg/ml
Dekking	
Drenasje	
Bandasje	
Merknader	Pasienten skal sitte med kjølemaske over øyenen i 20 – 30 minutter etter operasjonen. Legg en steril kompress mellom maske og operasjonsfelt
Arbeidsbeskrivelse	

Referanser

[SI/17.26-16](#)

[SI/17.28.03.26-13](#)

[Øye - Preoperativ desinfeksjon med Klorhexidin 1mg/ml](#)

[Pasientinformasjon - Tunge øyelokk](#)